

Der Vorstand

Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Telefon 0711 7875-3690
verordnungsberatung@kvbawue.de

26.11.2021

Unser Zeichen: Dr. M.

KVBW · Postfach 80 06 08 · 70506 Stuttgart

An alle für die Schnellinformation
angemeldeten Ärzte
der KVBW

Eindringliche Bitte: Bestellen Sie Spikevax® von Moderna für Ü 30, um BioNTech für U 30 zur Verfügung zu haben

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

wie inzwischen **leidlich** bekannt ist, stehen ab Ende November überwiegend Impfstoffdosen von Moderna für Schutzimpfungen gegen COVID-19 bereit. Die Menge des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer, der bislang vorrangig in den Arztpraxen verimpft wurde, ist bis auf Weiteres nur begrenzt bestell- und lieferbar.

Beide Impfstoffe gelten als hoch- und in ihrer Wirkung vergleichbar wirksam. Dennoch führt die Umstellung in den Praxen zu einem **unnötigem erhöhten Organisations-, Beratungs- und Aufklärungsaufwand**. Mit diesem Schreiben und der Ihnen in der Anlage beigefügten **Patienteninformation zum Ausdruck in Ihrer Praxis möchten wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen, sofern dies in diesem Republikchaos überhaupt noch möglich ist.**

1. Auffrischimpfung und Grundimmunisierung: Anwendung des Moderna-Impfstoffs von der STIKO ausdrücklich empfohlen

Auffrischimpfungen sollen laut Ständiger Impfkommission (STIKO) grundsätzlich mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, unabhängig davon, welcher Impfstofftyp (mRNA-Impfstoff oder Vektorimpfstoff) bei der Grundimmunisierung verwendet wurde. Wenn möglich, wird der mRNA-Impfstoff geimpft, der bei der Grundimmunisierung bereits zur Anwendung gekommen ist. Bereits seit 18. Oktober weist die STIKO jedoch darauf hin, dass auch der **jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden kann, sollte der vorgesehene nicht verfügbar sein.**¹ Beide mRNA-Impfstoffe – Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna – sind durch die Europäische Arzneimittelkommission grundsätzlich zur Grundimmunisierung ab dem Alter von 12 Jahren und zur Auffrischimpfung ab 18 Jahren zugelassen.²

2. Impfstoffspezifische Empfehlungen der STIKO zu Spikevax®: Nicht bei Personen unter 30 Jahren und nicht für Schwangere

Für Personen **unter 30 Jahren** empfiehlt die STIKO aufgrund des höheren Myokarditisrisikos von Spikevax®, ausschließlich Comirnaty® zu verwenden.³ Dies soll auch dann erfolgen, wenn diese Personen bereits eine erste Impfstoffdosis Spikevax® erhalten hatten. Steht Comirnaty® aufgrund von Liefereinschränkungen nicht zur Verfügung, sollte der Impftermin verschoben werden. Die STIKO weist darauf hin, dass wenn der empfohlene Abstand zwischen der 1. und 2. Impfstoffdosis überschritten wird, die Impfserie dennoch fortgesetzt werden kann und nicht neu begonnen werden muss.³

Bei der Impfung von Schwangeren liegen bisher keine vergleichenden Sicherheitsdaten für Comirnaty® und Spikevax® vor. Dennoch empfiehlt die STIKO, dass Schwangeren unabhängig vom Alter bei einer COVID-19-Impfung Comirnaty® angeboten werden soll.⁴

3. Anwendungshinweise zu Spikevax® (Moderna)

- Es ist keine Rekonstitution notwendig. Der Impfstoff wird gebrauchsfertig geliefert.
- Der Impfstoff ist ungeöffnet im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C max. 30 Tage haltbar; innerhalb dieses Zeitraums können bis zu 12 Stunden für den gekühlten Transport genutzt werden. Er ist dadurch nur bedingt für Hausbesuche oder zum Einsatz in Pflegeheimen geeignet.
- Nach Entnahme aus der Kühlung kann der ungeöffnete Impfstoff bis zu 24 Stunden bei 8 °C bis 25 °C aufbewahrt werden.
- Nach Entnahme der ersten Dosis aus dem Mehrdosenbehältnis (nach erstmaligem Durchstechen des Stopfens): 19 Stunden
- Für eine Impfung im Rahmen der Grundimmunisierung werden 0,5 mL aus dem Mehrdosenbehältnis aufgezogen und injiziert. Eine Auffrischimpfung wird mit der halben Dosis, also 0,25 mL durchgeführt.
- Soll ein Patient nach einmaliger Impfung mit dem Impfstoff COVID-19-Vaccine® Janssen eine Optimierung seiner Impfserie erhalten, werden hierfür 0,5 mL Spikevax® geimpft.
- Pro Vial können 5 mL entnommen werden, sodass es für 20 Auffrischimpfungen (0,25 mL) oder 10 Impfungen im Rahmen der Grundimmunisierung (0,5 mL) ausreicht.

In unserer Empfehlung beziehen wir uns ausdrücklich auf die Publikationen der STIKO „Epidemiologisches Bulletin“ insbesondere Nrn. 46 (18.11.2021) und 43 (18.10.2021) und weiterer unten angeführter Literatur, die dringlich zur Kenntnis genommen werden sollen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns aus Haftungsgründen strikt an die Feststellungen der STIKO zu halten haben und daher keine Stellungnahmen zu individuellen Fallkonstellationen über die STIKO hinaus abgeben dürfen.

4. Spikevax®: Abrechnung und Dokumentation

Indikation	Erstimpfung	Abschlussimpfung	Auffrischimpfung
Allgemein	88332A	88332B	88332R
Beruf	88332V	88332W	88332X
Pflegeheimbewohner/in	88332G	88332H	88332K

Die Impfziffern für die Impfstoffe von BioNTech finden Sie hier:

<https://www.kvbw-admin.de/api/download.php?id=3912>

Bei Fragen zur Abrechnung und Dokumentation der COVID-19-Impfungen erreichen Sie uns unter Tel. 0711 7875-3397 oder per E-Mail abrechnungsberatung@kvbawue.de

Zusammenfassend empfehlen wir Ihnen aufgrund der Lieferproblematik, die beiden mRNA-Impfstoffe vorrangig wie folgt einzusetzen:

- Spikevax® von Moderna: für Auffrischimpfungen (Dosis: 0,25 mL) und Grundimmunisierungen (Dosis: 0,5 mL) aller Patienten ab 30 Jahren.
- Comirnaty® von BioNTech: für Auffrischimpfungen und Grundimmunisierungen aller Patienten unter 30 Jahren und bei Schwangeren.

Unter <https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelles/coronavirus-sars-cov-2/impfung-gegen-covid-19/> haben wir zahlreiche weitere Informationen zur COVID-19-Impfung zusammengetragen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verordnungsberatung Impfungen unter Tel. 0711 7875-3690 oder per E-Mail verordnungsberatung@kvbawue.de

Und abschließend nochmals unsere Bitte: Nutzen Sie die Chance möglichst viele Patientinnen und Patienten vor Weihnachten zu impfen und bestellen Sie auch den Impfstoff von Moderna. Schließen Sie sich bitte auch mit anderen Praxen zusammen, und tauschen Sie untereinander gegebenenfalls Impfstoff aus, damit die Impfkampagne wie geplant weiterlaufen kann.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Norbert Metke
Vorsitzender des Vorstands



Dr. med. Johannes Fechner
Stv. Vorsitzender des Vorstandes

Anlage: Patientenmerkblatt

Literatur-Hinweise zur dringlichen Beachtung:

¹ 12. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung, Epid Bull 43/2021 (online vorab am 18.10.2021)

² <https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html>

³ 13. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung, Epid Bull 46/2021 (18.11.2021)

⁴ COVID-19-Impfung von Schwangeren und Stillenden, wissenschaftliche Begründung der STIKO, Epid Bull 38/2021 (online vorab am 17.9.2021)