Alles Gute.
KVBW
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg

Änderungen bei Rezepturen im SSB und mögliche Alternativen

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht BVerwG (Az. 3 C 2.24) vom 12. März 2026 sind **Rezepturen nicht mehr als Sprechstundenbedarf (SSB) verordnungsfähig.** Daher stellen Apotheken keine Rezepturen mehr auf SSB-Verordnungen oder Praxisbedarf her. In dieser Übersicht sind die Wirkstoffe, die von der Streichung der Rezepturverordnung betroffen sind, sowie mögliche Alternativen aufgeführt.

Wichtig:
Fertigarzneimittel (FAM) statt Rezeptur!
Wenn kein FAM verfügbar: Möglichkeit der Einzelverordnung (EVO) prüfen!

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Rezeptur	Anmerkung	Mögliche Alternativen
Antidota	Dimethylsulfoxid (DMSO)	✕	Nur zur Paravasatbehandlung	Nur Reinsubstanz in der geeigneten Konzentration
Dermatika	Aluminiumchlorid	✕	Lösung zur Blutstillung	Keine Alternativen
Dermatika	Silbernitrat (+ Kaliumnitrat)	✕	siehe auch Rhinologika	z. B. SILBERNITRAT-Kaliumnitr.Ätzstäb.Ätzstift®
Dermatika	Eisen(III)-Chlorid	✕	Lösung zur Blutstillung	Keine Alternativen
Dermatika	Eosin-Dinatrium	✕		z. B. EOSIN 2 % wässrige Lösung® (Medizinprodukt)
Dermatika	Phenol	✕	Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix, nur als Rezeptur erhältlich	Keine Alternativen
Dermatika	Polihexanid	✕		Wundgele (Verbandmittel): z. B.Prontosan®, Lavanid®, siehe auch Spüllösungen in der Anlage 1
Dermatika	Trichloressigsäure	✕		Keine Alternativen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Rezeptur	Anmerkung	Mögliche Alternativen
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	✕		FAM: Fertige Lösungen sowohl für den Vortest auf Gestationsdiabetes als auch den oralen Glukosetoleranztest. Ausschließlich die größtmögliche Packung des jeweiligen Herstellers, dabei die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Hersteller beachten Die Packungsgröße ist an den Versorgungsbedarf der Praxis anzupassen.
Diagnostika	Methacholin	✕	Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität	FAM z. B. Provokit®, Alternativ: Rezeptur als Einzelverordnung auf Namen des Patienten
Hämorrhoidenmittel	Polidocanol	✕	Submuköse Anwendung, siehe auch Venenmittel	Nur noch FAM z. B. Aethoxysklerol®
Kontrastmittel	Mannitol	✕		Nur Reinsubstanz
Lokalanästhetika	Lidocain + Tetracain	✕		Nur noch FAM z. B. Pliaglis®-Creme
Lokalanästhetika	Lidocain			Neue Darreichungsform für Auge/Nase/Ohr
Ophthalmika	Cefuroxim	✕	Nur für Katarakt-Operationen nur Augenärzte Ausschließlich Arzneimittel mit Zulassung zur intrakameralen Anwendung	FAM z. B. Aprokam®, Ximaract®
Ophthalmika	Cyclopentolat 0,5 % Kinder	✕		Keine Alternativen, ggf. EVO der Rezeptur auf Namen des Patienten
Ophthalmika	Fluorescein	✕	Keine Ampullen, da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)	Nur im Zusammenhang mit der Abrechnung einer GOP: Fluorescein-Teststreifen als Sachkosten
Ophthalmika	Hexamidin			Neuaufnahme als Augentropfen
Ophthalmika	Mitomycin C	✕	Fertigspritze bei Glaukom-Operationen	Wirkstoff gestrichen Nur noch Einzelverordnung der Rezeptur auf Namen des Patienten möglich

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Rezeptur	Anmerkung	Mögliche Alternativen
Ophthalmika	Phenylephrin 2,5 % Kinder	✕		Keine Alternativen, ggf. EVO der Rezeptur auf Namen des **Kindes, Verordnung der Rezeptur für Erwachsene nicht möglich**.
Ophthalmika	Phenylephrin + Tropicamid	✕		ggf. EVO der Rezeptur auf Namen des Kindes Erwachsene: FAM z. B. Mydriasert®
Ophthalmika	Polihexanid	✕		Keine Alternative
Ophthalmika	PVP-Jod	✕		Keine Alternative
Ophthalmika	Tetracain	✕	Nur zur Katarakt-Operation	Wirkstoff gestrichen Ausweichmöglichkeit auf andere Lokalanästhetika, z. B. Oxybuprocain, Lidocain oder Proparacain
Otologika	Glycerin/Ethanol (+ Salicylsäure)	✕		Keine Alternative, Wirkstoff gestrichen
Otologika	Ciprofloxacin + Hydrocortison	✕		Änderung in Ciprofloxacin+ Corticoide, z. B. Ohrentropfen Infectociprocort®, Cilodex® ggf. EVO der Rezeptursalbe auf Namen des Patienten, wenn benötigt
Otologika	Clotrimazol			Neuaufnahme als Ohrentropfen z. B. Otomyk®
Otologika	Lidocain-DMSO	✕	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell	Wirkstoff gestrichen Neuaufnahme des Einzelwirkstoffs Lidocain in die Anlage 1 unter Otologika
Otologika	Lidocain			Neuaufnahme unter Otologika
Otologika	Miconazol	✕	nur HNO-Ärzte	Wirkstoff gestrichen Neuaufnahme Clotrimazol
Otologika	Polymyxin + Bacitracin	✕	Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum	Wirkstoffkombination gestrichen Keine Alternativen ggf. Einzelverordnung auf Namen des Patienten, wenn zwingend notwendig, sonst Verwendung der Dreierkombination Polymyxin+ Bacitracin+ Hydrocortison, z. B. Infectospectran HC®-Salbe.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Rezeptur	Anmerkung	Mögliche Alternativen
Rhinologika	Argentum nitricum	✕	Nur zur Blutstillung bei Epistaxis	z. B. SILBERNITRAT-Kaliumnitr.Ätzstäb.Ätzstift®
Rhinologika	Lidocain			Neuaufnahme des Einzelwirkstoffs Lidocain in die Anlage 1 unter Rhinologika
Rhinologika	Naphazolin (± Lokal-anästhetikum)	✕	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/ Nasenendoskopie	Wirkstoffkombination gestrichen
Rhinologika	Naphazolin			Naphazolin als Einzelwirkstoff gestrichen
Rhinologika	Tetracain	✕		Wirkstoff gestrichen Neuaufnahme des Einzelwirkstoffs Lidocain in die Anlage 1 unter Otologika
Rhinologika	Xylometazolin + Lokalanästhetikum	✕	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/ Nasenendoskopie	Wirkstoffkombination gestrichen Xylometazolin als Einzelwirkstoff verordnungsfähig Lidocain als Einzelwirkstoff verordnungsfähig