

Liste der zulässigen Mittel Sprechstundenbedarf

Anlage I: Gem. § 4 Abs. 1 Vereinbarung über vertragsärztl. Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Analgetika / Antirheumatika	Ammoniumbituminosulfonat							X	Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder Iontophorese	
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X							
	ASS (Acetylsalicylsäure) + Codein		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Buprenorphin	X	X							Oral: Nicht zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Dexketoprofen	X								Nur zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen
	Diclofenac	X	X		X			X		Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: Nur in besonderen Fällen. Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder Iontophorese
	Diclofenac + Codein		X							
	Etoricoxib		X							Nur zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-Op., nur MKG-Chirurgie (in diesem Zusammenhang auch für Anesthesisten)
	Hydromorphon		X							
	Ibuprofen		X		X					Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Metamizol	X	X		X					Parenteral: Nur in besonderen Fällen.
	Morphin	X	X							Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Nalbuphin	X								Nur zur Anästhesie bei Kindern

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Naproxen		X							
	Oxycodon	X	X							Nur bei bekanntem Versagen anderer Opiate
	Paracetamol	X	X		X					Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		X					Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin + Naloxon		X							Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Tramadol	X	X							Oral: keine Retardformen
Antiallergika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infectokrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis
	Bamipin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Cetirizin		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Dimetinden	X	X							Oral:Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
Antiarrhythmika	Adenosin	X								Siehe auch Diagnostika
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Flecainid	X								
	Ipratropiumbromid	X								
	Lidocain	X								
	Orciprenalin	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antiasthmatika / Broncholytika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Siehe auch Antihypotonika
	Beclometason						X			Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, nur Dosieraerosole
	Fenoterol						X			Siehe Gynäkologika
	Fenoterol + Ipratropiumbromid						X			
	Ipratropiumbromid						X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation						X			Nur physiologische Kochsalzlösung
	Reproterol	X								
	Salbutamol		X				X			Oral nur Lösungen; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen β_2 -Sympathomimetika behandelt werden können
	Terbutalin	X								
Theophyllin	X								Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall	

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antibiotika	Amoxicillin		X							
	Amoxicillin + Clavulansäure	X	X							Oral nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien bei Patienten mit Risikofaktoren
	Ampicillin	X								
	Azithromycin		X							
	Cefaclor		X							
	Cefazolin	X								
	Cefotaxim	X								Nur zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis
	Ceftriaxon	X								
	Cefuroxim/-axetil	X	X							Intrakameral nur in besonderen Fällen!
	Ciprofloxacin	X	X							Nur in besonderen Fällen
	Clindamycin	X	X							
	Cotrimoxazol		X							
Doxycyclin	X									
Erythromycin	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Gentamicin	X						X		Extern nur als Ketten
	Metronidazol	X	X			X				Vaginalsupp. 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Penicillin G	X								
	Penicillin V		X							
	Piperacillin-Tazobactam	X								Nur zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, nur onkologisch tätige Ärzte
	Rifampicin		X							Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	X								Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
Antidiarrhoika	Elektolyte + Glucose		X							Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antidota	Acetylcystein (NAC)	X								Nur als Antidot
	Atropin	X								
	Aktivkohle		X							
	Biperiden	X								Siehe auch Parkinsonmittel
	Dimethyl-aminophenol	X								
	Dimethylsulfoxid (DMSO)							X	X	Nur zur Paravasatbehandlung
	Dimeticon		X							Nur bei Spülmittelvergiftungen, nur Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X								Nur bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe
	Flumazenil	X								
	Hyaluronidase	X								Subcutan: Nur zur Paravasatbehandlung
	Ipecacuanha-Sirup		X						X	Nur als NRF-Rezeptur erhältlich
	Lipid-Emulsion 20%	X								Nur für Anästhesisten bei Lokalanästhetika-Intoxikation
	NAC									Siehe Acetylcystein
Naloxon	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Natriumthiosulfat	X								
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika
	Obidoxim	X								
	Orciprenalin	X								Siehe auch Antiarrhythmika
	Physostigmin	X								
	Protamin	X								
	Pyridostigmin	X								Siehe auch Cholinergika
	Simeticon		X							Siehe Dimeticon
	Sugammadex	X								Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.
	Toluidinblau (Tolonium)	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antiemetika / Antivertiginosa	Dimenhydrinat	X	X		X					Rektal: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X		X					Rektal: Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Domperidon		X							Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jugendlichen Patienten
	Droperidol	X								
	Metoclopramid	X	X		X					
	Ondansetron	X	X							Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid									Siehe Psychopharmaka

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Tropisetron	X								Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
Antiepileptika	Clonazepam	X								
	Diazepam	X			X					Siehe auch Hypnotika/ Tranquillantien
	Phenobarbital	X								
	Phenytoin	X								
	Valproinsäure	X								
Antihämorrhagika	Menadion									Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon									Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	X	X							
	Tranexamsäure	X	X							
	Vitamin K1									Siehe Phytomenadion

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antihypertonika	Clonidin	X	X							
	Dihydralazin	X								
	Metoprolol	X								
	Nifedipin	X	X							Oral: Keine Retardformen!
	Nitrendipin		X							Oral: Nur Phiole; Vertrieb wird im Jahr 2021 eingestellt - Alternativen für den hypertensiven Notfall siehe Clonidin, Nifedipin, Urapidil
	Pindolol	X								
	Sotalol	X								
	Urapidil	X								
	Verapamil	X								
Antihypoglykämika	Glucagon	X								
	Glucose	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	X								Keine Autoinjektoren Siehe auch Antiallergika
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X								Z. B. Akrinor
	Dobutamin	X								
	Dopamin	X								
	Ephedrin	X								
	Epinephrin									Keine Autoinjektoren Siehe Adrenalin
	Noradrenalin	X								
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X								Nur für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7
Antitussiva	Codein		X							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
	Dihydrocodein		X							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
Betarezeptoren- blocker										Siehe Antihypertonika
Calciumantagonisten										Siehe Antihypertonika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Cholinergika	Neostigmin	X								Siehe auch Antidota
	Pyridostigmin	X								Siehe auch Antidota
Corticoide	Corticoide	X	X		X					<p>parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.;</p> <p>parenteral ohne Mengenbegrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen</p> <p>oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal</p> <p>oral flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal</p>
Dermatika	Alkoholische Lösungen									Siehe Desinfektionsmittel
	Aluminiumchlorid							X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ammoniumbituminosulfonat							X		Siehe Analgetika/Antirheumatika
	Bamipin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Argentum nitricum							X	X	Siehe auch Rhinologika
	Betamethason (+ Antiseptika)							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Betamethason + Clotrimazol							X		Nur Dermatologen
	Betamethason + Fusidinsäure							X		Nur Dermatologen, HNO- und Kinderärzte
	Betamethason + Gentamycin							X		Nur HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal
	Clobetasol (+ Antiseptika)							X		
	Dexpanthenol							X		Nur Urologen und Kinderärzte
	Eisen(III)chlorid							X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Eosin-Dinatrium							X	X	Lösung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ethacridinlactat							X		
	Framycetin + Lidocain							X		Extern: Nur Kegel
	Fusidinsäure							X		Nur zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion
	Hydrocortison (+ Antiseptika)							X		Rezepturen: Siehe § 4 Abs. 1 SpBV
	Imiquimod							X		Nur zur Erstanwendung bei aktinischer Keratose
	Mupirocin							X		
	Natriumbituminosulfonat							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Phenol							X	X	Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix (Rezeptur)
	Podophyllotoxin 5 mg							X		Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polihexanid							X	X	Nur Arzneimittel
	Prednicarbat (+ Antiseptika)							X		
	PVP-Iod							X		
	Silbernitrat									Siehe Argentum nitricum
	Sulfadiazin-Silber							X		
	Triamcinolon + Zinkoxid							X		
	Trichloressigsäure							X	X	Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich
	Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer(II)-nitrat									Nur , wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist, z. B. Solcoderman
	Zinkoxidschüttelmixtur							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Desinfektionsmittel und Hautentfettungs- mittel	Benzin DAB (Wundbenzin)							X		
	Chlorhexidin							X		Nur für Augenärzte und für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen
	Desinfektionsmittel							X		Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Hände-, Instrumenten- und Flächendesinfektion
	Ethanol 70%							X		Nur für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal
	Isopropanol 70%							X		
	Wasserstoffperoxid 3%							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Diagnostika	Adenosin	X								Siehe auch Antiarrhythmika
	Allergie-Testsubstanzen									Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil									Nur als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Baclofen	X								Nur als Diagnostikum (0,05 mg Amp.)
	Carbachol						X	X		Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität (Rezeptur)
	Choriongonadotropin	X								Nur zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Cortcorelin (CRH)	X								
	CRH									Siehe Corticorelin
	Dimeticon		X							Nur als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen
	GHRH									Siehe Somatorelin

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Glucose-Monohydrat		X							Nur für Glucoseprobetrunck, nur Pulver , 1. Vortest auf Gestationsdiabetes (EBM 01776) - 55 g Glucose-monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose (nur im Flachbeutel); 2. Oraler Glukosetoleranztest (oGTT - EBM 01777) - 82,5 g Glucose-monohydrat entsprechen 75 g wasserfreier Glucose (im Flachbeutel oder in einer 300 ml Gewindeflasche); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte
	Gonadorelin (LHRH)	X								
	LHRH									Siehe Gonadorelin
	L-Arginin-HCl	X								Nur für die quantitative Bestimmung von HGH/STH
	Methacholin						X			
	Methylcellulose		X							Als Diagnostikum zur MRT-Sellink-Untersuchung
	Natriumperchlorat		X							Siehe auch Schilddrüsentherapeutika
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Protirelin	X					X			
	Regadenoson	X								
	Secretin	X								
	Simeticon		X						Siehe Dimeticon	
	Somatorelin (GHRH)	X								
	Tetracosactid	X							Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform	
	Thyreoliberin (TRF)	X					X		Inhalativ: Nasale Anwendung	
	TRF								Siehe Thyreoliberin	
	Tuberkulin	X							Intradermale Verabreichung	
	Urinteststreifen								Nur zur ausschließlichen Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten	

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Diuretika	Furosemid	X	X							Keine retardierten Darreichungsformen
	Kalium-canrenoat	X								
	Torasemid	X	X							
Fibrinolytika	Alteplase	X								Nur zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg).
Gase										Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Aer medicalis						X			
	Kohlendioxid							X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
	Narkosegase									Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff						X			
	Stickstoff							X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
Gichtmittel	Colchicin		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Gynäkologika	Antibiotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Estriol					X				Nur zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Dinoproston					X				
	Fenoterol	X								
	Gemeprost					X				außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum									Siehe auch medizinisch technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie;
	Hexetidin					X				
	Methylergometrin	X								
	Metronidazol									Siehe Antibiotika
Oxytocin	X								Siehe auch Hypophysenhormone	
PVP Iod (Povidon-Iod)					X					

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
H2-Rezeptorenblocker	Cimetidin	X								<p>1. als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histamin-bedingten Allergien und Intoleranzen</p> <p>2. zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration (nur für Anästhesisten und Chirurgen)</p>
	Ranitidin	X								<p>Ruhen der Zulassung - Alternative siehe Cimetidin</p> <p>Nur zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration</p>
Hämorrhoidenmittel	Polidocanol	X								Submuköse Anwendung; Siehe auch Venenmittel , als Rezeptur wirtschaftlicher
	Lidocain				X					
	Cinchocain				X					
Homöopathika / Anthroposophika										Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. Nur in Deutschland zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Hypnotika / Tranquillantien	Chloralhydrat				X					
	Diazepam	X	X		X					
	Lorazepam	X	X							
	Lormetazepam		X							
	Midazolam	X	X							
	Zolpidem		X							Nur für Schlaflabore.
Hypophysenhormone	Oxytocin	X								Siehe auch Gynäkologika
Impfstoffe										Siehe Sera/Impfstoffe
Infusionslösungen	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Gelatinepolysuccinat	X								
	Glucose	X								Siehe auch Antihypoglykämika
	L-Arginin-HCl									Siehe Diagnostika
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								Siehe physiologische Kochsalzlösung

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Natriumhydrogencarbonat	X								
	Physiologische Kochsalzlösung	X								Siehe auch Spüllösungen. Nicht im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopen (in der Leistung enthalten)
Kardiaka	Digitoxin	X	X							
	Digoxin	X								
Keratolytika / Warzenmittel										Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren										Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.
Koronarmittel	Glyceroltrinitrat	X	X							Keine Retardformen
	Isosorbiddinitrat		X							Keine Retardformen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe. Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065
	Sorbitol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe
Lokalanästhetika	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	X								
	Chloroprocain	X								
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum								X	Siehe auch medizinisch-techn. Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
Lidocain	X							X	Externa: Gel, Spray, Lösung	

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain	X						X		Externa: Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Lidocain + Ropivacain	X							X	nur zur Tumescenz-Lokalanästhesie; nur dann, wenn andere Lokalanästhetika keinen gewünschten Zusatznutzen, wie die langanhaltende Analgesie erbringen; nur als Rezeptur erhältlich
	Lidocain 10 % + Tetracain 7 %							X	X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
	Prilocain + Epinephrin	X								
	Ropivacain	X								
Lösungsmittel										Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen
	Aqua ad injectabilia	X								Zur Rekonstitution
Migränemittel	Frovatriptan		X							
	Sumatriptan	X	X		X		X			Nasal: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Mineralstoffe	Calcium	X								
	Magnesium	X								Nur für gynäkologische und kardiologische Indikationen
Mund- und Rachen-therapeutika	PVP-Iod (Povidon-Iod)									Siehe Dermatika
Muskelrelaxantien	Atracuriumbesilat	X								
	Baclofen	X								Nur 0,05 mg Amp. zur Diagnostik
	Cisatracurium	X								
	Dantrolen	X								
	Diazepam	X	X		X					
	Mivacurium	X								
	Pridinol	X								
	Rocuroniumbromid	X								
Suxamethonium-chlorid	X									
Vecuroniumbromid	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Narkosemittel	Alfentanil	X								
	Desfluran						X			
	Esketamin	X								
	Etomidat	X								
	Fentanyl	X								
	Isofluran						X			
	Ketamin	X								
	Lachgas						X			Ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X								
	Remifentanil	X								
	Sevofluran						X			
	Sufentanil	X								
Thiopental	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Ophthalmika										Verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen
	Acetylcholinchlorid	X		X						Lösung zur intraokularen Instillation
	Atropin			X						
	Acetazolamid	X	X							
	Azithromycin			X						Nur zur Instillation in den Tränenkanal
	Bibrocathol			X						
	Bromfenac			X						Außer Handel, dafür Nepafenac
	BSS									Siehe auch Spüllösung
	Ciprofloxacin			X						Siehe auch Antibiotika/Otologika
	Cyclopentolat			X						
	Dexamethason			X						
	Dexamethason + Gentamycin			X						Nur zur postoperativen Anwendung
	Dexpanthenol			X						Nur Augensalbe, nur für Augenverbände
	Diclofenac			X						
	Dorzolamid			X						

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Epinastin			X						
	Fluorescein			X						Keine Ampullen , da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fluorescein + Oxybuprocain			X						
	Fusidinsäure			X						
	Ganciclovir			X						
	Gentamicin			X						
	Hyaluronidase	X								
	Hydrocortison			X						
	Hypromellose			X						CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			X						
	Lidocain			X					X	Nur zur Katarakt-OP als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia)
	Latanoprost			X						

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Mitomycin C	X							X	Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. Cave: Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!
	Natamycin			X					X	
	Nepafenac			X						
	Ofloxacin			X						
	Oxybuprocain			X						
	Phenylephrin			X						
	Phenylephrin + Tropicamid			X					X	Nur zur Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinstkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, nur als Rezeptur erhältlich
	Pilocarpin			X						
	Povidon			X						CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X						
	Proparacain			X						
	Proxymetacain									Siehe Proparacain
	PVP-Iod			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Spüllösungen									Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen
	Scopolamin			X						
	Tetracain			X						Nur zur Katarakt-Op., auch EDO (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)
	Tetryzolin			X						Zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Timolol			X						
	Tropicamid			X						
Otologika	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Ciprofloxacin			X						Auch als Rezeptur; siehe auch Antibiotika/Ophthalmika
	Ciprofloxacin + Hydrocortison			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Ciprofloxacin + Fluocinolon			X						
	Dexamethason + Cinchocain			X						
	Lidocain-DMSO			X					X	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Miconazol			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Polymyxin + Bacitracin			X					X	Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison			X					X	Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC ; max. 3x25g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: Keine Mengenbegrenzung
Parkinsonmittel	Biperiden	X								Siehe auch Antidota
Protonenpumpenhemmer	Omeprazol	X								Nur bei akuter Ulkusblutung
	Pantoprazol	X								Nur bei akuter Ulkusblutung
Psychopharmaka	Amitriptylin	X								
	Doxepin	X								
	Fluspirilen	X								Nur 10 Ampullen á 1,5mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen
	Haloperidol	X	X							Keine Depotformen; oral: Tropfen
	Levomepromazin	X	X							Oral: Tropfen
	Olanzapin	X								
	Promethazin	X	X							Auch als Antiallergikum und Antiemetikum

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Sulpirid	X								Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum
Rezepturen										Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte „Rezeptur“ gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff..
Rhinologika	Argentum nitricum							X	X	Nur als Rezeptur zur Blutstillung bei Epistaxis
	Adrenalin (Epinephrin)							X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, s. Antihypotonika
	Naphazolin			X				X	X	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasendoskopie, als Zusatz zu Lokalanästhetika, auch als Rezeptur. Siehe auch Urologika. Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Tetracain			X					X	Nur als Rhinologika
	Xylometazolin			X				X	X	Siehe Naphazolin
Schilddrüsen-therapeutika	Natriumperchlorat									Siehe Diagnostika
Sera / Impfstoffe	Aktive Impfstoffe									Siehe Schutzimpfungsvereinbarung
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X								
	Diphtherie-Immunglobulin	X								
	Tetanus-Immunglobulin	X								Nicht bei Arbeitsunfällen
Spasmolytika	Atropin	X								Siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X								
	Tropium	X								
Spüllösungen										Nur nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungs-fähige Spüllösungen
	Aqua ad injectabilia							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)
	BSS							X		Siehe auch Ophthalmika
	NaCl									Siehe Physiologische Kochsalzlösung

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Physiologische Kochsalzlösung							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung							X		Nur Arzneimittel (z.B. Serasept); auch als Rezeptur Siehe auch Dermatika
	Ringerlösung							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Sorbitol + Mannitollösung							X		
Thrombozyten- aggregationshemmer										Nicht bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM)
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X							
	Clopidogrel		X							Nur als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.
	Ticagrelor		X							Nur als Initialdosis
Trägerlösungen		X								Siehe Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Tuberkulosemittel										Siehe Antibiotika
	Tuberkulintest									Siehe Diagnostika
Urologika										Siehe auch Diagnostika
	Naphazolin							X		Siehe Rhinologika; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum							X		Siehe auch medizinisch-technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika.
Venentherapeutika	Polidocanol									Siehe Hämorrhoidenmittel
Verdünnungslösungen										Siehe Lösungsmittel
Wundtherapeutika										Siehe Dermatika

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Medizinisch-technische Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	Nur in Zusammenhang mit ambulanten Op's, nicht zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. Periduralanästhesie	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	Keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungs-nadeln, keine Tumorlokalisations-nadeln; auch Biopsi-systeme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat
Drainageschläuche, -saugeräte		
Dreiwegehähne		Keine Mehrwegebänke
Dünndarmsonden		Nur zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm	
Führungsdraht für Venenkatheter		Nicht bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekana-lisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchungen	Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Pro-dukte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste

Medizinisch-technische Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	Keine Curetten
Hodensuspensorien		Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	Auch Einmaltransfusionbestecke
Infusionsfilter		Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250)
Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme		
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	Ausschließlich die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen
Kirschnerdrähte		Nur Standardprodukte, keine Sonderanfertigung
Magensonden		Nur zur Diagnostik
Mandrins		
Mundspatel		Nur unsteril

Medizinisch-technische Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z. B. PDS-Folie®,...); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	Keine Elektroden
Patientenschläuche für Medizinpumpen		Keine Verlängerungsschläuche
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke	Keine Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen)
Punktionsbestecke		Siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		Nur für Infusionsbestecke
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden / -brillen	Einmalprodukte	Zur Therapie hypoxämischer Zustände
Sekretbeutel		Nur zur Gallen- und Wunddrainage
Spezialkanülen zur Anästhesie		Siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Stomapaste		Nur für die Akutversorgung der Stomata; Nur für Urologen und Chirurgen

Medizinisch-technische Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	Soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO abgegolten, nur zur Anwendung in der Praxis, keine Kalt-Warm-Kompressen
TIVA-Sets		Nur wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung nur durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urostomiebeutel	einteiliges System	Nur für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung
Urinauffangbeutel		1. zur Uringewinnung bei Kindern 2. bei Erwachsenen nur im Zusammenhang mit der Erstanlage eines Katheters durch den Arzt ausschließlich beim Hausbesuch
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	Nur zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen		Nur unsteril
Wundklammern		Keine Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u. ä.; keine Meniskusfixationsmaterialien
Zungenläppchen		

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		Siehe unter: dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		Nur wenn nicht teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		Nur solche, die so vom Hersteller gekennzeichnet sind
Endloswindeln und ggf. Netzhosen		Nur als Vorlage nach operativen Eingriffen, Netzhosen nur in Verbindung mit Endloswindeln
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	Keine Gehschuhe
Fingerschienen		Nur Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z. B. Chrisofix®)
Fingerverband / Zehenverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber	auch Knochenwachs	
Gips		
Gipsbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Halskrawatten		Nur Meterware
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, keine Schaumstoffwundaufkl.	Nicht zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		Nur unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	
Ohrenbinden	zur Stabilisierung und Abdeckung von Verbänden am Ohr	nur für HNO-Ärzte und Chirurgen
Papierbinden		
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	Keine Sprühpflaster oder Verbandssprays, Silikonpflaster nur eine Packung pro Quartal
Polster		Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Polsterbinden		Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Rucksackverbände	nur als Meterware	

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		Nur als Meterware, keine Fertigabschnitte
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	Synthetische Stützverbände: nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen;
Tamponadebinden	Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	Sterile und unsterile;
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.
Tamponadestreifen	Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	Sterile und unsterile;
Tapeverbände		Kein Kinesiotape
Tupfer		Sterile und unsterile, keine Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		Nur zur Notfallversorgung
Verbandklammern		Keine Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	Zur feuchten Wundbehandlung: nur Hydrokolloidverbände (siehe dort); siehe auch Pflaster; keine Verbandstoffe mit Aktivkohle
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		