

Liste der zulässigen Mittel Sprechstundenbedarf

Anlage 1: Gem. § 4 Abs. 1 Vereinbarung über vertragsärztl. Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014 in der Fassung vom 01.10.2025

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Analgetika/Antirheu- matika	Ammoniumbituminosulfonat							X		Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder lontophorese
	Acetylsalicylsäure	X	X							
	Buprenorphin	X	X							Oral : Nicht zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Dexketoprofen	X								Nur zur i. vAnwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Diclofenac	X	X		×			×		Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: Nur in besonderen Fällen. Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder lontophorese
	Hydromorphon		Χ							
	lbuprofen	X	X		X					Parenterale Anwendung: Nur für Anästhesisten und nur für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen laut Fachinfo (Ausschließlich für Kinder und Jugendliche zugelassen Produkte)
	Metamizol	Χ	Χ		Χ					Parenteral: Nur in besonderen Fällen.
	Morphin	X	X							Oral : Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Nalbuphin	X								Nur zur Anästhesie bei Kindern
	Naproxen		X							
	Oxycodon	X	X							Nur bei bekanntem Versagen anderer Opiate
	Paracetamol	×	X		X					Oral : Saft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		Χ					Rektal: nur Gynäkologen

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin + Naloxon		X							Oral : Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Tramadol	X	X							
Antiallergika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infectokrupp, akute stenosierende Laryngo- tracheitis
	Bamipin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Cetirizin		Χ							
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Dimetinden	X	×							Oral : Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum <i>vollendeten 12. Lebensjahr</i> bzw. Jugendliche bis zum <i>vollendeten 18. Lebensjahr</i> mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
Antiarrhythmika	Adenosin	Χ								Siehe auch Diagnostika
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Flecanid	X								
	Lidocain	Χ								
	Sotalol	X								
Antiasthmatika/ Broncholytika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Siehe auch Antihypotonika

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Beclometason						X			Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, <i>nur Dosieraerosole</i>
	Fenoterol						Χ			Siehe Gynäkologika
	Fenoterol + Ipratropiumbro- mid						X			
	Ipratropiumbromid						X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation						X			Nur physiologische Kochsalzlösung
	Reproterol	Χ								
	Salbutamol		X				×			Oral nur Lösungen; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen ß2-Sympathomimetika behandelt werden können
	Terbutalin	X								
	Theophyllin	X								Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall. Eine N1 Packung pro Arzt und Quartal.
Antibiotika	Amoxicillin		Χ							
	Amoxicillinn + Clavulansäure	X	X							Oral : nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien
	Ampicillin	X								
	Azithromycin		Χ							
	Cefaclor		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Cefazolin	X								
	Cefotaxim	X								Nur zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis
	Ceftriaxon	X								
	Cefuroxim/-axetil	X	X							Intrakameral nur in besonderen Fällen! Siehe auch Ophthalmika
	Ciprofloxacin	X	X							Nur unter sorgfältiger Nutzen/Risiko Abwägung: siehe Indikationseinschränkungen Rote-Hand-Briefe
	Clindamycin	X	Χ							
	Cotrimoxazol		Χ							
	Doxycyclin	X								
	Erythromycin	X								
	Gentamicin	Χ						Χ		Extern nur als Ketten
	Metronidazol	X	X			X				Vaginalsupp. 1000 mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Penicillin G	X								
	Penicillin V		X							
	Piperacillin-Tazobactam	X								Nur zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, nur onkologisch tätige Ärzte
	Rifampicin		X							Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	orm			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	X								Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
Antidiarrhoika	Elektrolyte + Glucose		X							Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
Antidota	Acetylcystein (NAC)	X								Nur als Antidot
	Atropin	X								
	Aktivkohle		Χ							
	Biperiden	X								Siehe auch Parkinsonmittel
	Dimethyl-aminophenol	X								
	Dimethylsulfoxid (DMSO)							Χ	Χ	Nur zur Paravasatbehandlung
	Dimeticon		X							Nur bei Spülmittelvergiftungen, nur Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X								Nur bei Methanolvergiftung oder zur Delir- prophylaxe
	Flumazenil	X								
	Hyaluronidase	X								Subcutan: Nur zur Paravasatbehandlung
	Lipid-Emulsion 20 %	X								Nur für Anästhesisten und Neurochirurgen bei Lokalanästhetika-Intoxikation
	NAC									Siehe Acetylcystein
	Naloxon	X								
	Natriumthiosulfat	Χ								
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Physostigmin	Х								
	Obidoxim	X								
	Protamin	X								
	Simeticon		Χ							Siehe Dimeticon
	Sugammadex	X								Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.
	Toluidinblau (Tolonium)	X								
Antiemetika/Antiver- tiginosa	Dimenhydrinat	×	X		X					Rektal : Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X		X					Rektal : Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Domperidon		X							Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jugendlichen Patienten
	Droperidol	X								
	Metoclopramid	Χ	Χ		Χ					

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ondansetron	X	X							Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid									Siehe Psychopharmaka
Antiepileptika	Clonazepam	X								
	Diazepam	X			X					Siehe auch Hypnotika/Tranquillantien
	Phenobarbital	Χ								
	Phenytoin	Χ								
	Valproinsäure	Χ								
Antihämorrhagika	Menadion									Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon									Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	Χ	Χ							
	Tranexamsäure	X	X							
	Vitamin K1									Siehe Phytomenadion
Antihypertonika	Clonidin	X	X							
	Dihydralazin	X								
	Metoprolol	X								
	Nifedipin	X	X							Oral: Keine Retardformen!

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Nitrendipin		X							Oral : Nur Phiolen; Vertrieb wurde im Jahr 2021 eingestellt – Alternativen für den hypertensiven Notfall siehe Clonidin, Nifedipin, Urapidil
	Urapidil	X								
	Verapamil	X								
Antihypoglykämika	Glucagon	X								
	Glucose	X								
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	X								Keine Autoinjektoren, keine Rezepturen Siehe auch Antiallergika
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X								z. B.Akrinor
	Dobutamin	X								
	Dopamin	X								
	Ephedrin	X								
	Epinephrin									Keine Autoinjektoren Siehe Adrenalin
	Noradrenalin	X								
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X								Nur für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	orm			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antitussiva	Codein		×							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo. Nur für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/Onkologen, Gynäkologen, Bereitschaftspraxen
	Dihydrocodein		×							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo Nur für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/Onkologen, Gynäkologen, Bereitschaftspraxen
Betarezeptorenblo- cker										Siehe Antihypertonika
Calciumantagonisten										Siehe Antihypertonika
Cholinergika	Neostigmin	X								Siehe auch Antidota

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungs	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Corticoide	Corticoide	X	×		×					Parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 150 Amp Andere Fachgruppen: 100 Amp Parenteral ohne Mengenbegrenzung: Nur Anästhesisten/onkologisch tätige Ärzte: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese Oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal Oral Flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal
Dermatika	Alkoholische Lösungen									Siehe Desinfektionsmittel
	Aluminiumchlorid							X	×	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ammoniumbituminosulfonat							X		Siehe Analgetika/Antirheumatika
	Argentum nitricum							X	X	Siehe auch Rhinologika
	Bamipin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Betamethason							X		
	Betamethason + Fusidinsäu- re							X		Nur Dermatologen, HNO- und Kinderärzte

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Betamethason + Gentamicin							X		Nur HNO-Ärzte, max. 1 \times 50 g / Arzt und Quartal
	Clobetasol							Χ		
	Dexpanthenol							Χ		Nur Urologen und Kinderärzte
	Eisen(III)chlorid							X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Eosin-Dinatrium							X	Χ	Lösung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ethacridinlactat							Χ		
	Framycetin + Lidocain							Χ		Extern: Nur Kegel
	Fusidinsäure							X		Nur zur Akuttherapie einer Staphylokokken- Infektion
	Hydrocortison							Χ		
	Mupirocin							X		
	Natriumbituminosulfonat							Χ		
	Phenol							X	X	Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix; nur als Rezeptur erhältlich
	Podophyllotoxin 5 mg							X		Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polihexanid							Χ	X	
	Prednicarbat							X		
	PVP-lod							X		
	Silbernitrat									Siehe Argentum nitricum

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Sulfadiazin-Silber							X		
	Triamcinolon + Zinkoxid							X		
	Trichloressigsäure							X	X	Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich
	Zinkoxidschüttelmixtur							X		
Desinfektionsmittel und Hautentfettungs- mittel	Desinfektionsmittel Allge- mein: Bei den aufgeführten Einzelwirkstoffen sind aus- schließlich die angegebenen Konzentrationen verord- nungsfähig. Bitte die jeweili- gen Anmerkungen beachten							×		Ausschließlich Lösungen mit Anwendungsgebiet Haut-, Schleimhaut- und Wunddesinfektion zur Anwendung am Patienten - Nicht zur Händedesinfektion des Patienten - Keine Verwendung zur Instrumentenund Flächendesinfektion in der Praxis - Keine Händedesinfektion von Arzt und Praxispersonal
	Benzin DAB (Wundbenzin)							Χ		
	Chlorhexidin ab 0,1 %		X							Nur für mund-, kiefer- und gesichtschirurgi- sche Leistungen
	Ethanol 70 %							X		Nur für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal
	Isopropanol 70 %							Χ		

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Wasserstoffperoxid 3 %							X		
Diagnostika	Adenosin	X								Siehe auch Antiarrhythmika
	Allergie-Testsubstanzen									Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil									Nur als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Baclofen	X								Nur als Diagnostikum (0,05 mg Amp.)
	Choriongonadotropin	X								Nur zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Corticorelin (CRH)	X								
	CRH									Siehe Corticorelin
	Dimeticon		X							Nur als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen
	GHRH									Siehe Somatorelin

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Glucose-Monohydrat		X						X	Pulver (Abfüllung): 1. Vortest auf Gestationsdiabetes 55 g Glucose-Monohydrat (nur im Flachbeutel) 2. Oraler Glukosetoleranztest 82,5 g Glucose-Monohydrat (im Flachbeutel oder in einer 300 ml Gewindeflasche) Fertigarzneimittel: Fertige Lösungen sowohl für den Vortest auf Gestationsdiabetes als auch den oralen Glukosetoleranztest. Ausschließlich die größtmögliche Packung des jeweiligen Herstellers, dabei die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Hersteller beachten. Die Packungsgröße ist an den Versorgungsbedarf der Praxis anzupassen. Keine als Lebensmittel deklarierten Produkte Keine Lösungen als Rezepturen
	Gonadorelin (LHRH)	Χ								
	LHRH									Siehe Gonadorelin

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	L-Arginin-HCI	X								Nur für die quantitative Bestimmung von HGH/STH
	Methacholin						X			Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyper- reaktivität
	Methylcellulose		X							Als Diagnostikum zur MRT-Selink-Untersuchung
	Natriumperchlorat		X							Zur Blockade der Schilddrüse bei entspre- chenden diagnostischen Verfahren sofern nicht mit EBM abgegolten
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika
	Protirelin	Χ					X			
	Regadenoson	Χ								
	Secretin	Χ								
	Simeticon		X							Siehe Dimeticon
	Somatorelin (GHRH)	X								
	Tetracosactid	X								Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform
	Thyreoliberin (TRF)	Χ					X			Inhalativ: Nasale Anwendung
	TRF									Siehe Thyreoliberin
	Tuberkulin	Χ								Intradermale Verabreichung

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Urinteststreifen									Nur zur ausschließlichen Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten
Diuretika	Furosemid	X	Χ							Keine retardierten Darreichungsformen
	Kaliumcanrenoat	X								
	Torasemid	X	Χ							
Fibrinolytika	Alteplase	X								Nur zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg).
Gase										Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Aer medicalis						X			
	Kohlendioxid							X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoan- algesie bei chron. Schmerzen
	Narkosegase									Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff						X			
	Stickstoff							X		Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoan- algesie bei chron. Schmerzen
Gynäkologika	Antibiotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Antiseptische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Estriol					X				Nur zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Dinoproston					Χ				
	Fenoterol	X								
	Gemeprost					X				Außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; CAVE: Patientenaufklärung!
	Gleitmittel mit Lokalanästhe- tikum									Siehe auch medizinisch techn. Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zuge- lassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie
	Hexetidin					Χ				Siehe Antiseptische Gynäkologika
	Methylergometrin	X								
	Metronidazol									Siehe Antibiotika
	Oxytocin	Χ								Siehe auch Hypophysenhormone
	PVP lod (Povidon-lod)					X				Siehe Antiseptische Gynäkologika

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
H2-Rezeptorenblo- cker	Cimetidin	×								1. als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histaminbedingten Allergien und Intoleranzen 2. zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration (nur für Anästhesisten und Chirurgen)
	Ranitidin	X								Ruhen der Zulassung – Alternative siehe Cimetidin Nur zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration
Hämorrhoidenmittel	Lidocain				Χ					
	Cinchocain				X					
	Polidocanol	X								Submuköse Anwendung; siehe auch Venenmittel

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Homöopathika/Anth- roposophika										Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. Nur in Deutschland regis- trierte und zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte, keine Einzel- und Sonderan- fertigungen (z. B. Rezepturen)
Hypnotika/Tranquil- lantien	Diazepam	X	X		X					, , , ,
	Lorazepam	X	X							
	Midazolam	X	X		X					Rektal: Adapter kein SSB
	Zolpidem		Χ							Nur für Schlaflabore
Hypophysenhormone	Oxytocin	X								Siehe auch Gynäkologika
Impfstoffe										Siehe Sera/Impfstoffe
Infusionslösungen	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Gelatinepolysuccinat	X								
	Glucose	X								Siehe auch Antihypoglykämika
	L-Arginin-HCI									Siehe Diagnostika
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								Siehe physiologische Kochsalzlösung
	Natriumhydrogencarbonat	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Physiologische Kochsalzlö- sung	X								Siehe auch Spüllösungen. Nicht im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
Kardiaka										
	Digoxin	X								
Keratolytika/Warzen- mittel										Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase
Kontrastmittel bei bildgegebenden Ver- fahren										Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.
Koronarmittel	Glyceroltrinitrat	X	Χ							Keine Retardformen
	Isosorbiddinitrat		X							Nur Sublingualtabletten
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnosti- schen und therapeutischen Eingriffen

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogen-phosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnosti- schen und therapeutischen Eingriffen. Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065
	Sorbitol (+ Kombinationen)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
Lokalanästhetika	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	Χ								
	Chloroprocain	X								
	Gleitmittel mit Lokalanästhe- tikum							×		Siehe auch medizinisch-techn. Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zuge- lassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
	Lidocain	X						X		Externa: Gel, Spray, Lösung, Creme Parenteral: keine Präparate mit Indikation "Neuraltherapie"
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain							X		Externa : Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Lidocain 10% + Tetracain 7%							Χ	X	Nur als Rezeptur erhältlich

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
	Prilocain + Epinephrin	Χ								
	Ropivacain	X								
Lösungsmittel										Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen
	Aqua ad injectabilia	Χ								Zur Rekonstitution
Migränemittel	Sumatriptan	X	X				X			Nasal: Nur für Jungendliche zwischen 12 und 17 Jahren
Mineralstoffe	Calcium	Χ								
	Magnesium	X								Nur für gynäkologische und kardiologische Indikationen
Mund- und Rachen- therapeutika	PVP-Jod (Povidon-Iod)									Siehe Dermatika
Muskelrelaxantien	Atracuriumbesilat	X								
	Baclofen	Χ								Nur 0,05 mg Amp. zur Diagnostik
	Cisatracurium	Χ								
	Dantrolen	X								
	Diazepam	X	X		Χ					
	Mivacurium	Χ								
	Pridinol	X								
	Rocuroniumbromid	Χ								
	Suxamethoniumchlorid	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	orm			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Vecuroniumbromid	Χ								
Narkosemittel	Alfentanil	Χ								
	Desfluran						Χ			
	Esketamin	Χ								
	Etomidat	Χ								
	Fentanyl	Χ								
	Isofluran						Χ			
	Ketamin	Χ								
	Lachgas						X			Ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X								
	Remifentanil	X								
	Sevofluran						X			
	Sufentanil	X								
	Thiopental	Χ								
Ophthalmika										Verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen
	Acetylcholinchlorid			X						Lösung zur intraokularen Instillation
	Atropin			X						
	Acetazolamid	X	X							
	Azithromycin			×						Nur zur Instillation in den Tränenkanal. Nur Augenärzte
	Bibrocathol			X						

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	BSS									Siehe auch Spüllösung
	Cefuroxim/-axetil	X								Intrakameral nur in besonderen Fällen!
	Ciprofloxacin			X						Siehe auch Antibiotika/Otologika
	Cyclopentolat			X						
	Dexamethason			X						
	Dexamethason + Gentami- cin			X						Nur zur postoperativen Anwendung, nur Augenärzte
	Dexpanthenol			X						Nur Augensalben, nur für Augenverbände
	Diclofenac			X						
	Dorzolamid			X						
	Fluorescein			X						Keine Ampullen, da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angio- graphische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fluorescein + Oxybuprocain			Χ						
	Fusidinsäure			Χ						Nur Augenärzte
	Ganciclovir			Χ						Nur Augenärzte
	Gentamicin			X						
	Hyaluronidase	X								
	Hydrocortison			X						
	Hypromellose			X						CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			Χ						

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Lidocain			X					X	Nur zur Katarakt-Op. als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4 % + Hypromellose 2 % in Aqua ad injectabilia)
	Latanoprost			X						Nur Augenärzte, nicht zur Behandlung von chronischen Glaukomerkrankungen
	Mitomycin C	X							×	Fertigspritze bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. CAVE :Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!
	Nepafenac			X						
	Ofloxacin			X						
	Oxybuprocain			X						
	Phenylephrin			X						
	Phenylephrin + Tropicamid			×					×	Nur zur Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinstkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, nur als Rezeptur erhältlich
	Pilocarpin			X						
	Polihexanid			X					Χ	Nur als Rezeptur erhältlich
	Povidon			X						CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X						
	Proparacain			X						
	Proxymetacain									Siehe Proparacain
	PVP-Jod			X					Χ	Nur als Rezeptur erhältlich

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Spüllösungen									Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen
	Scopolamin			X						
	Tetracain			X						Nur zur Katarakt-Op., auch EDO (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)
	Tetryzolin			X						Zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Timolol			X						
	Tropicamid			X						
Otologika	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Ciprofloxacin			X						
	Ciprofloxacin + Fluocinolon			X						
	Ciprofloxacin + Hydrocortison			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Dexamethason + Cinchocain			X						
	Lidocain-DMSO			X					X	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trom- melfell; nur als Rezeptur erhältlich
	Miconazol			X					Χ	Nur als Rezeptur erhältlich
	Polymyxin + Bacitracin			X				X	X	Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum; nur als Rezeptur erhältlich

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison			X				X		Zur Behandlung der Otitis externa, z. B. Infectospectran HC®; max. 3 x 25 g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: Keine Mengenbegrenzung
Parasympatholytika	Glycopyrroniumbromid	X								Nur Anästhesisten. Pro Arzt und Quartal maximal eine Packung mit 10 Ampullen
Parkinsonmittel	Biperiden	X								
Protonenpumpen- hemmer	Omeprazol	X								Nur bei akuter Ulkusblutung
	Pantoprazol	X								Nur bei akuter Ulkusblutung
Psychopharmaka	Doxepin	X								
	Fluspirilen	X								Nur 10 Ampullen á 1,5 mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen
	Haloperidol	X	X							Keine Depotformen; oral:Tropfen
	Levomepromazin	X	X							Oral:Tropfen
	Promethazin	Χ	Χ							Auch als Antiallergikum und Antiemetikum
	Sulpirid	X								Eine i.vApplikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Rezepturen									x	Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen können nur dann über den Sprechstundenbedarf bezogen werden, wenn der jeweilige Wirkstoff in Anlage 1 dieser Vereinbarung in der Spalte "Rezeptur" entsprechend gekennzeichnet ist. Im Falle eines Lieferengpasses bei einem Fertigarzneimittel können Rezepturen
										nur nach vorheriger Freigabe durch die Vertragspartner für einen befristeten Zeitraum über den Sprechstundenbedarf bezogen werden. Die KVBW informiert in diesen Fällen zeitnah auf ihrer Homepage über die entsprechende Ausnahmeregelung.
Rhinologika	Argentum nitricum							X	X	Nur zur Blutstillung bei Epistaxis; nur als Rezeptur erhältlich
	Adrenalin (Epinephrin)							X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, Anwendung laut Fachinformation. Keine Rezepturen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Naphazolin			×				X		Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/ Nasenendoskopie Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugend- liche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. Siehe auch Urologika
	Naphazolin + Lokalanästhe- tikum			X				×	×	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasen- endoskopie; nur als Rezeptur erhältlich Siehe auch Urologika
	Tetracain			X					X	Nur als Rezeptur erhältlich
	Xylometazolin			x				X		Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/ Nasenendoskopie Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugend- liche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.
	Xylometazolin + Lokalanäs- thetikum			×				X	X	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasenendoskopie; nur als Rezeptur erhältlich
Sera/Impfstoffe	Aktive Impfstoffe									Siehe Schutzimpfungsvereinbarung
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X								
	Diphterie-Immunglobulin	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsi	form			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Tetanus-Immunglobulin	X								Nicht bei Arbeitsunfällen
Spasmolytika	Atropin	X								Siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X								
Spüllösungen										Nur nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungsfähige Spüllösungen
	Aqua ad injectabilia							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)
	BSS							X		Siehe auch Ophthalmika
	NaCl									Siehe Physiologische Kochsalzlösung
	Physiologische Kochsalzlö- sung							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung							X		Nur Arzneimittel (z. B. Serasept)
	Ringerlösung							X		Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Sorbitol + Mannitollösung							X		
Thrombozytenaggregationshemmer										Nicht bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM)
	Clopidogrel		X							Nur als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.

Indikationsgruppe	Wirkstoff			Darreich	ungsf	orm			Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	ASS (Acetylsalicylsäure)	Χ	Χ							
	Ticagrelor		X							Nur als Initialdosis
Trägerlösungen		X								Siehe Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel
Tuberkulosemittel										Siehe Antibiotika
	Tuberkulintest									Siehe Diagnostika
Urologika										Siehe auch Diagnostika
	Naphazolin							X		Siehe Rhinologika; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitmittel mit Lokalanästhe- tikum							X		Siehe auch medizinisch-techn. Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zuge- lassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhe- tika.
Venentherapeutika	Polidocanol									Siehe Hämorrhoidenmittel
Verdünnungslösungen										Siehe Lösungsmittel
Wundtherapeutika										Siehe Dermatika

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	Nur in Zusammenhang mit ambulanten OPs, nicht zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. Peridualanästhesie	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	Keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; auch Biopsiesysteme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat
Drainageschläuche, -sauggeräte		
Dreiwegehähne		Keine Mehrwegebänke
Dünndarmsonden		Nur zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm	
Führungsdraht für Venenkatheter		Nicht bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchungen	Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	Keine Curetten
Hodensuspensorien		Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen
		Auch Einmaltransfusionbestecke
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	Als Zytostatika-Zubehör deklarierte Produkte ausschließlich für onkologisch tätige Ärzte

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Infusionsfilter		Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den "Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe" (TRBA 250)
Injektions-/InfusionsnadeIn für Portsysteme		
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	Ausschließlich die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen
Kirschnerdrähte		Nur Standardprodukte, keine Sonderanfertigung
Magensonden		Nur zur Diagnostik
Mandrins		
Mundspatel		Nur unsteril
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z. B. PDS-Folie®,); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	Keine Elektroden
Patientenschläuche	Im Zusammenhang mit der Verwendung von Infusionspumpen, auch Perfusorleitungen	Keine Verlängerungsschläuche Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke	Keine Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen
Punktionsbestecke		Siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		Nur für Infusionsbestecke
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden/ -brillen	Einmalprodukte	Zur Therapie hypoxämischer Zustände

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Sauerstoffmasken mit Reservoir	Einmalprodukte	Zur Therapie hypoxämischer Zustände. Nur wenn nicht teuer als Sauerstoffmasken ohne Reservoir.
Sekretbeutel		Nur zur Gallen- und Wunddrainage
Spezialkanülen zur Anästhesie		Siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Stomapaste		Nur für die Akutversorgung der Stomata; Nur für Urologen und Chirurgen
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	Soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO abgegolten, nur zur Anwendung in der Praxis, keine Kalt-Warm-Kompressen
TIVA-Sets		Nur wenn auschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung nur durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urinauffangbeutel		Zur Uringewinnung bei Kindern
Urinbeutel	Einwegurinbeutel ohne Ablass	 Beim Hausbesuch: Nur im Zusammenhang mit der Erstanlage eines Katheters durch den Arzt Urologen: Nur bei Erstanlage eines Katheters in der Praxis, maximal 10 Stück pro Arzt und Quartal
Urostomiebeutel	einteiliges System	Nur für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung
Überleitgeräte für Spüllösungen		Nur Urologen und Gynäkologen
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	Nur zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen steril		Nur Augenärzte, max. 100 Stück pro Arzt und Quartal
Wattestäbchen unsteril		

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Wundklammern		Keine Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u. ä.; keine Meniskusfixationsmaterialien
Zungenläppchen		

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		Siehe unter : dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Ohrenbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		Nur wenn nicht teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		Nur solche, die so vom Hersteller gekennzeichnet sind
Endloswindeln und ggf. Netzhosen		Nur als Vorlage nach operativen Eingriffen; Netzhosen nur in Verbindung mit Endloswindeln
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	Keine Gehschuhe
Fingerschienen		Nur Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z. B. Chrisofix®)
Fingerverband/Zehenverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber	auch Knochenwachs	
Gips		
Gipsbinden		
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, keine Schaumstoffwundaufl.	Nicht zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandsstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		Nur unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	
Ohrenbinden	Zur Stabilisierung und Abdeckung von Verbänden am Ohr	Nur für HNO-Ärzte und Chirurgen
Papierbinden		
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	Keine Sprühpflaster oder Verbandssprays; Silikon-Rollenpflaster zur Fixierung: nur eine Packung pro Arzt und Quartal
Polster		Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Polsterbinden		Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden
Rucksackverbände	nur als Meterware	
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		Nur als Meterware, keine Fertigabschnitte
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	Synthetische Stützverbände: nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungstörungen
Tamponadebinden	Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	Sterile und unsterile
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	Keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.
Tamponadestreifen	Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	Sterile und unsterile
Tapeverbände		Kein Kinesiotape
Tupfer		Sterile und unsterile, keine Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		Nur zur Notfallversorgung

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Verbandklammern		Keine Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	Zur feuchten Wundbehandlung: <i>nur</i> Hydrokolloidverbände (s. dort); siehe auch Pflaster; keine Verbandstoffe mit Aktivkohle
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		